

correct



GROEP



Bel ons voor een gratis inspectie en advies!

Overlast van muizen of ratten? Wij helpen u graag!

Met een professioneel preventieplan van Correct Ongediertepreventie

Muizen en ratten zorgen bij veel bedrijven voor grote schade. Deze schade is zeer divers van poep en urine in voedingswaren, tot compleet stilgelegde productielijnen door knaagschade aan kabels. Tevens kan door knaagschade van ratten en muizen brand ontstaan.

Effectieve muizenbestrijding

Het bestrijden van deze knaagdieren vraagt om een maatwerk aanpak. Effectief muizen bestrijden begint met een inspectie. Onze specialist inspecteert geheel vrijblijvend uw situatie. Waar nodig doen wij u direct een voorstel voor bestrijding van de muizen.

Ontwikkeling van muizen en ratten

De snelheid waarmee ratten en muizen zich voortplanten maakt bestrijding erg ingewikkeld. De huismuis is tussen de 7 en 10 cm lang en heeft een lichtbruine tot donkergrijze kleur.

Oplossingen:

- Wering d.m.v. gaas, timmerwerk of katten (gaten dichten)
- Slagval
- Vangkooien
- Fretteren
- Gifstoffen

Zijn kop heeft grote oren en een spitse snuit. Een muis is na twee maanden geslachtsrijp. In de periode tussen 2 en 12 maanden kan een muis 6 tot 10 nesten van 5-6 jongen voortbrengen.


In hoeverre een populatie muizen zich uitbreidt hangt af van de nestgelegenheid en de hoeveelheid / kwaliteit van het beschikbare voedsel. Wordt een nest te groot, dan kan er een natuurlijke uitdunning plaatsvinden van het aantal muizen of kunnen muizen besluiten een andere nestplaats te zoeken en zich afscheiden van de bestaande populatie.

Bruine ratten planten zich het gehele jaar door voort, mits er voldoende voedsel is en er geen extreme temperaturen zijn. De voortplanting zal toenemen en er zullen meer jongen geboren worden wanneer de populatiedichtheid daalt (bijvoorbeeld door menselijk ingrijpen). De draagtijd is 21 tot 23 dagen. Een vrouwtje kan 1 tot 20 jongen per worp krijgen, maar meestal krijgt het vrouwtje 7 tot 12 jongen. Een vrouwtje kan iedere 4 tot 6 weken gedekt worden, ook als ze haar jongen nog aan het zogen is. Per jaar krijgen vrouwtjes op deze manier meer dan 30 jongen.

Preventieplan

Wij zijn gespecialiseerd in het opzetten van ongediertepreventieplannen. Het is immers beter te voorkomen dan te genezen.

Na het aanbrengen van professionele wering, kan de bestrijding plaatsvinden. Is wering niet mogelijk? Dan wordt direct begonnen met de bestrijding door toepassing van een slagval of met gifstoffen. Hierdoor bent u snel van uw ongedierte af.



Meer weten? Bel ons voor een gratis inspectie en advies.

Correct Ongediertepreventie
Ambachtstraat 6
4261 TJ Wijk en Aalburg
Tel. 0416 - 69 14 91

info@correct-groep.nl
www.correct-groep.nl

